


Anche la settimana trascorsa è stata caratterizzata da una stabilizzazione delle alte temperature. Si protrae anche per questa settimana l'aumento dei problemi fitosanitari dovuto ad insetti parassiti, mentre, si abbassa il livello di attacco da parte di funghi parassiti e batteri mantenendo un rischio di livello medio-basso.

In dettaglio vediamo le condizioni meteo registrate nella settimana passata.

Le stazioni di rilevamento sono ubicate nell'azienda agraria dell'Istituto Calvi e rientrano nel progetto di "Agricoltura di precisione".


Bollettino 26 Dati settimanali dal **16/08/2023** al **22/08/2023**

Temperatura dell'aria (°C)
16/08/2023 - 23/08/2023



La settimana scorsa è stata caratterizzata da un aumento delle temperature sia diurne che notturne, la temperatura massima è stata di 36°.


Umidità dell'aria (%)
16/08/2023 - 23/08/2023



L'umidità dell'aria si è mantenuta abbastanza alta, con un picco del 98%.


Quantità di pioggia (mm)

16/08/2023 - 23/08/2023



Quantità di pioggia (cumulata) (mm)


16/08/2023 - 23/08/2023



Non si sono verificati fenomeni piovosi.

Velocità media del vento (km/h)

16/08/2023 - 23/08/2023



Massima velocità del vento (km/h)

16/08/2023 - 23/08/2023



La velocità del vento per questa settimana si è mantenuta sui 3-5 km/h, con un picco massimo di quasi 14 km/h nelle giornate del 22-23 agosto.

Radiazione solare (W/m2)

16/08/2023 - 23/08/2023




Cielo limpido.

Previsioni per la prossima settimana


Temperatura / Precipitazioni

23 Ago - 30 Ago 2023



Precipitazioni / Probabilità di precipitazioni

23 Ago - 30 Ago 2023



Per questa settimana è prevista una stabilizzazione delle temperature sino al fine settimana, la probabilità di pioggia raggiunge il 68% nelle giornate di domenica, lunedì e mercoledì con una bassa probabilità nei giorni precedenti.

Rischio Medio per le fitopatie:

Pero: Fase di maturazione; rischio **medio** per le piogge.

Rischio **medio-alto** per il **colpo di fuoco** batterico. Eliminare le fioriture secondarie e parti colpite dal batterio per evitare che si introduca nella pianta.

Carpocapsa possibile presenza di uova e larve di terza generazione, intervenire solo in caso di danni dalle generazioni precedenti.

Rischio **medio-alto** per nuove infezioni di **maculatura bruna**, si attende un aumento per le piogge della settimana prossima, intervenire con prodotti specifici, ove ci sono i sintomi dovuti agli attacchi passati.

Rischio medio per la **Ticchiolatura** intervenire soltanto in caso di evidenti sintomi che dovessero manifestarsi.

Controllare la presenza di **ragnetto rosso** e intervenire se necessario.

Controllare la presenza di **cimice asiatica**.

Vite: invaiatura-maturazione; sospendere la difesa per la peronospora. Mantenere attentamente monitorate le colture e intervenire con prodotti di copertura ove necessario.

Rischio infettivo medio-basso per **oidio**, intervenire in caso di previsioni riportanti pioggia.

Medio rischio per la **tignoletta**, aumento del volo, intervenire se si supera la soglia del 5% di grappoli infestati.

Prestare attenzione ai viraggi del colore fogliare che possono indicare un possibile attacco del fitoplasma della **flavescenza dorata**, se presente si ricorda l'obbligo provinciale di estirpo di piante con tali sintomi.